

Impact des bandes fleuries sur les ravageurs du cassis

Impact des bandes fleuries sur les ravageurs du cassis

Des bandes fleuries ont été implantées afin de soutenir les populations d'osmies après la floraison du cassis, en leur fournissant des ressources alimentaires complémentaires.

Compte tenu de la valeur économique d'un cocon d'osmie, estimée à partir de 0,80 €, leur maintien constitue un enjeu important.

Objectif

Évaluer les interactions potentielles des bandes fleuries avec les ravageurs et les pathogènes du cassis.


Méthode de comptage

Quadrat de 30x30cm

Comptage direct



On estime le niveau de dégâts :



4 Parcelles x 3 Modalités x 50 Mesures = **1800 Observations**

Des bandes fleuries ont été implantées afin de soutenir les populations d'osmies après la floraison du cassis, en leur fournissant des ressources alimentaires complémentaires.

Compte tenu de la valeur économique d'un cocon d'osmie, estimée à partir de 0,80 €, leur maintien constitue un enjeu important.

Objectif

Évaluer les interactions potentielles des bandes fleuries avec les ravageurs et les pathogènes du cassis.


Méthode de comptage

Quadrat de 30x30cm




Comptage direct



On estime le niveau de dégâts :



4 Parcelles x 3 Modalités x 50 Mesures = **1800 Observations**




Bandes fleuries =

Pucerons et chenilles

- + de ressources pour les auxiliaires
- Régulation des ravageurs
- Moins de ravageurs et de dégâts

Anthracnose

- moins de projection d'eau
- Dispersion plus faible des spores d'anthracnose,



Bandes fleuries =

Pucerons et chenilles

- + de ressources pour les auxiliaires
- Régulation des ravageurs
- Moins de ravageurs et de dégâts

Anthracnose

- moins de projection d'eau
- Dispersion plus faible des spores d'anthracnose,